

喜療瘀™ 凝膠

衛署藥輸字第025606號

Hirudoid® Gel

主要活性成份：

每100公克的凝膠中含有300毫克的
Chondroitin polysulfate(mucopolysaccharide
polysulfate)，相當於25,000 U。
Chondroitin polysulfate來自牛的氣管軟管。

其他成份：

Isopropyl alcohol, polyacrylic acid, propylene glycol, perfume, sodium hydroxide, purified water

包裝：

分14公克、40公克、100公克管裝。

適應症：

「鈍物創傷後之血腫，淺層性靜脈炎之局部治療」。

投與方式及劑量：

投與喜療瘀凝膠的期間及用量為何？

依據患部大小，每天二至三次，一般而言，擦上3至5公分長之藥品即足夠。

如何使用喜療瘀凝膠？

請將喜療瘀凝膠均勻地塗抹於患處。
喜療瘀凝膠應用於完整的皮膚，並避免與眼睛及黏膜接觸。
如同所有含酒精成份的凝膠一般，投與喜療瘀凝膠後不可包紮。
若用於電離子導藥療法，喜療瘀凝膠應由陰極導入。

喜療瘀凝膠的使用療程為何？

使用喜療瘀凝膠應持續至病況緩解為止。鈍物創傷的治療應持續10天以上，淺層性靜脈炎則應治療1-2週。
長期使用喜療瘀凝膠並無不可，但若持續治療兩週之後病情無法獲得改善，或停藥後再復發，請諮詢您的醫師。

注意事項：

何時不可使用喜療瘀凝膠？

當您對於Chondroitin polysulfate或其他相關成份過敏時，不可使用本品。不可將喜療瘀凝膠塗抹於傷口或受傷的皮膚。

懷孕及授乳的婦女是否可使用喜療瘀凝膠？

就目前現有的資料顯示，懷孕及授乳的婦女使用喜療瘀凝膠並無任何不良的情況出現。

本品為醫師藥師藥劑生指示藥品

藥物交互作用

未知

副作用

使用喜療瘀凝膠可能發生的副作用為何？

過敏反應如發紅等現象發生，但停藥之後即可獲得緩解。

副作用發生時的處理方式為何？

如果發生上述的副作用時，請立即停藥並諮詢您的醫師。
如果發生的副作用是這張仿單中未提及的，煩請通知您的醫師或藥師。

藥品的有效期限：

藥品的有效期限將清楚地標示於每個產品的管底及盒底。請勿使用過期的產品。

藥品的保存方式：

本產品需儲存在低於30°C之環境下，請避免陽光直射，以防產品變質。請放置於孩童不易觸及的地方。

製造廠：Mobilat Produktions GmbH

廠址：Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen/Ilm, Germany.

國外許可證持有者：F430052000 Medinova AG
國外許可證持有者地址：Eggbuehlstrasse 14, 8050 Zurich, Switzerland

藥商： DKSH 台灣大昌華嘉股份有限公司
地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓
電話：(02)8752-6666